

## **Gebrauchsanweisung**

### **Aspecton® Hustenstiller Isländisch Moos**

Für Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 1 Jahr

Bei Schleimhautreizungen in Mund und Rachen und damit verbundenem trockenem Reizhusten

#### **Liebe Patientin, lieber Patient,**

bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **Was ist in Aspecton® Hustenstiller enthalten?**

100 ml Flüssigkeit enthalten 11,12 g Flüssigextrakt aus Lichen islandicus (1:1)

##### Sonstige Bestandteile:

Kaliumsorbat, Maltitol-Lösung, Citronensäure wasserfrei, Hydroxyethylcellulose, Macrogolglycerolhydroxystearat, Propylenglykol, Sucralose, Honigaroma, gereinigtes Wasser.

alkohol-, zucker-, gluten- und lactosefrei

#### **Wann wird Aspecton® Hustenstiller angewendet?**

Aspecton® Hustenstiller wird angewendet bei Schleimhautreizungen im Mund und Rachen und damit verbundenem trockenem Reizhusten.

Die Inhaltsstoffe des Isländisch Moos (Lichen islandicus) legen sich schützend über die Mund- und Rachenschleimhaut. Die beanspruchte Schleimhaut wird dadurch vor äußeren Reizen geschützt, und der Entstehung des Hustens wird vorgebeugt.

Die reizlindernde Wirkung wird durch den hohen Anteil an Schleimstoffen im Isländisch Moos-Extrakt erzielt. Diese verhindern ein Austrocknen der Schleimhäute durch Binden von Wasser an der Oberfläche.

#### **Wann ist bei der Anwendung von Aspecton® Hustenstiller Vorsicht geboten?**

Bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe darf Aspecton® Hustenstiller nicht angewendet werden.

Aspecton® Hustenstiller ist nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr.

Dieses Medizinprodukt enthält Maltitol-Lösung. Bitte nehmen Sie Aspecton® Hustenstiller erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

10 ml enthalten 3,43 g Maltitol. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen. Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g Maltitol.

Maltitol kann eine leicht abführende Wirkung haben.

Macrogolglycerolhydroxystearat kann Magenverstimmung und Durchfall hervorrufen.

Dieses Medizinprodukt enthält 556 mg Propylenglycol pro 10 ml.

Nehmen Sie dieses Medizinprodukt nicht ein, wenn Sie schwanger sind oder stillen oder wenn Sie an einer Leber- oder Nierenerkrankung leiden, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen empfohlen. Ihr Arzt führt möglicherweise zusätzliche Untersuchungen durch, während Sie dieses Medizinprodukt einnehmen.

### **Wie wird Aspecton® Hustenstiller angewendet?**

Erwachsene und Jugendliche ab 11 Jahren nehmen 3- bis 4-mal täglich 10 ml, Kinder von 5 – 10 Jahren 2-mal täglich 10 ml und Kinder von 1 – 4 Jahren 2- bis 3-mal täglich 2,5 ml ein.

Der Packung liegt ein Messbecher zur genauen Dosierung bei.

#### Hinweis für Diabetiker:

10 ml entsprechen 0,29 BE.

Unmittelbar nach der Einnahme von Aspecton® Hustenstiller sollten Sie nicht essen oder trinken, weil das Produkt sonst eventuell wieder zu schnell von der Mund- und Rachenschleimhaut entfernt wird.

Falls die Beschwerden länger als 3 Tage ohne Besserung bestehen, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### **Welche Hinweise zur Haltbarkeit sind zu beachten?**

Das Verfalldatum der ungeöffneten Flasche ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch der Flasche ist das Produkt 6 Monate verwendbar.

### **In welchen Packungsgrößen ist Aspecton® Hustenstiller erhältlich?**

Aspecton® Hustenstiller ist in Flaschen mit 200 ml erhältlich.

Der Packung ist jeweils ein Messbecher beigelegt.



HÄLSA Pharma GmbH  
Maria-Goeppert-Straße 5  
23562 Lübeck  
Deutschland

CE 0482

Hersteller des Messbechers:  
STELLA Kunststofftechnik GmbH  
H.J.-Müller-Straße 4  
65343 Eltville  
Deutschland

CE 0123

### **Stand der Gebrauchsanweisung**

April 2021

**Für Kinder unzugänglich aufbewahren!**